



LES CANCERS DES VOIES AÉRO-DIGESTIVES SUPÉRIEURES (VADS) >>




LE SAVIEZ-VOUS ?

- Les cancers des VADS sont le 5e type de cancer le plus fréquent en France.
- 70% des 17 000 nouveaux cas de cancer des VADS sont diagnostiqués à un stade avancé.

LEUR POSSIBLE LOCALISATION :

- **A Massif facial supérieur et moyen** : base du crâne, orbites, nez, fosses nasales, sinus de la face...
- **B Cavité buccale** : langue, mâchoire, joue, palais, lèvres...
- **C Pharynx** :
 - **C.a. Rhinopharynx** : région située en arrière des fosses nasales.
 - **C.b. Oropharynx** : amygdales, voile du palais, base de la langue...
 - **C.c. Hypopharynx** : sinus piriformes, paroi pharyngée postérieure...
- **D Larynx** : épiglotte, cordes vocales, sous-glotte...
- **E Glandes salivaires** : parotide, glande sous-maxillaire, glandes salivaires accessoires.



2024

LES FACTEURS DE RISQUE :

— Tabac et alcool

Le tabac et l'alcool sont les principaux facteurs de risque de cancer des VADS. Le cumul de l'alcool et du tabac potentialise le risque de développer un cancer des VADS, l'un augmentant l'effet de l'autre.

— Papillomavirus (HPV)

ce virus sexuellement transmissible peut induire un cancer des amygdales ou de la base de la langue.

— Poussières de bois et fumées

toxiques : certaines professions comme les ébénistes, les ouvriers du bâtiment et les pompiers sont particulièrement exposés.

— **Mais aussi...** des tumeurs rares pouvant toucher des hommes et des femmes de tout âge, d'origine non identifiée.



SE FAIRE DÉPISTER :

— Pour qui ?

Le dépistage des cancers des VADS s'adresse principalement aux sujets ayant une consommation régulière d'alcool et de tabac, mais également aux sujets non fumeurs/non buveurs, du fait de l'augmentation de la fréquence des cancers liés au papillomavirus.

— Comment ?

Un examen clinique complet des voies aéro-digestives supérieures par un chirurgien maxillo-facial ou ORL peut être réalisé à la recherche d'une éventuelle lésion cancéreuse ou pré-cancéreuse.

LES SIGNES D'ALERTE :

L'un des symptômes suivant **pendant plus de trois semaines** doit amener à consulter un chirurgien maxillo-facial ou ORL :

— **Langue douloureuse, ou aphte** ne guérissant pas et/ou plaques blanches ou rouges dans la bouche.

— **Mal de gorge.**

— **Enrouement persistant.**

— **Difficulté ou douleur en avalant.**

— **Ganglions dans le cou.**

— **Narine bouchée ou saignement de nez.**



Contact

01 40 87 55 60



Découvrez l'offre de soins du service de chirurgie maxillo-facile et stomatologie de l'hôpital Beaujon :

